

**Ն/ե ակտեմրա® (տոցիլիզումաբ) պոլիարտիկուլյար
յուվենիլ իդիոպատիկ արթրիտի (պՅԻԱ) բուժման համար**

Ինչ է պետք իմանալ ակտեմրայի մասին

Այս գրքույկը պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն օգնելու
պՅԻԱ-յով հիվանդներին և իրենց ծնողներին հասկանալու
ակտեմրայով բուժման առավելությունները և վտանգը:

Այս ուսուցողական նյութերը պարտադիր են ներերակային (ն/ե) ակտեմրայի հետզրանցումային դիտարկման համար՝ ցուցված մանկական պոլիարտիկուլյար յուվենիլ իդիոպատիկ արթրիտի (պՅԻԱ) բուժման համար՝ նվազեցնելու դեղի ընդունման հետ կապված ընդգծված վտանգները:

Հետադարձ կապ՝

Դուք կարող եք կապվել ստորև ներկայացված կոնտակտային տվյալներով.

ՖարմաՏեք ՍՊԸ-ի դեղերի անվտանգության բաժին՝ Հոֆֆմանն-Լյա Ռոշե ընկերության դեղերի անվտանգության պատասխանատու Գայանե Ղազարյանին, հետևյալ բջջային հեռախոսահամարով. +37491796688, կամ անվտանգության մասնագետի փոխարինող՝ Ռիմա Դավթյանին. +374 10734643 հեռախոսահամարով կամ գրել է.նամակ հետևյալ հասցեյով. gayaneh.ghazaryan@gmail.com (rimea@pharmatech.am), ինչպես նաև ուղել Ձեր հաղորդակցությունը Ռոշ Մոսկվա դեղերի անվտանգության բաժին. էլ.հասցեյով. moscow.ds@roche.com, բջջ. հեռ. +7-495-229 2999, ֆաքս: +7-495- 229 7999:

Ի՞նչ պետք է իմանալ ակտեմրայի մասին

Պոլիարտիկուլյար յուվենիլ իդիոպատիկ արտրիտի (պՅԻԱ)՝ աուտոիմուն հիվանդության ճիշտ բուժումը շատ կարևոր է: Բոլոր դեղերը ունեն ինչպես պոտենցիալ առավելություններ, այնպես էլ պոտենցիալ վտանգ, ինչը պետք է հասկանալ: Այս երկուսի հավասարակշռության գտնելը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ օգտագործել այն:

Ակտեմրան օգտագործվում է բուժելու պՅԻԱ-յով հիվանդ երեխաների համար: Ակտեմրան օգտագործվում է 2 տարեկան և բարձր տարիքի պՅԻԱ երեխաների բուժելու համար, որը հանդիսանում է բորբոքային հիվանդություն, ընթանում է մեկ և ավելի հոդերի ցավով և այտուցով: Ակտեմրան օգտագործվում է բարելավելու պՅԻԱյի ախտանիշները և կարող է օգտագործվել մետոտրեքսատի հետ զուգակցված կամ մոնոթերապիայում:

Այս գրքույկը կպատասխանի որոշ հարցերին, որը վերաբերվում է ակտեմրայի օգտագործման հետ կապված որոշակի կողմնակի ազդեցության և պոտենցիալ վտանգների հետ, որոնք կապված են ակտեմրայի ընդունման հետ: Զրուցեք ձեր կամ ձեր երեխայի բուժվող բժշկի, բուժքրոջ կամ դեղագետի հետ, եթե ունեք որևէ խնդիր կամ հարց:

Այս գրքույկը չի փոխարինում, ձեր բժիշկի , բուժքրոջ կամ դեղագետի հետ խորհրդատվությունը:

Այս գրքույկը չի փոխարինում, ձեր բժիշկի , բուժքրոջ կամ դեղագետի հետ խորհրդատվությունը:

Երբեմն դեղերը դուրս են գրվում այլ նպատակների համար, որոնք այստեղ նշված են: Ընդունեք ակտեմրան միայն այն նպատակով, որով այն ձեզ համար ցուցված է:

Ի՞նչ պետք է իմանալ պՅԻԱյի և ակտեմրայի մասին

Ի՞նչ է բերում պՅԻԱյի առաջացմանը:

պՅԻԱյի հստակ պատճառը անհայտ է: պՅԻայի ժամանակ, օրգանիզմի իմունային համակարգը չի աշխատում համապատասխան: Իմունային համակարգը ենթադրվում է, որ պետք է հակահարված հասցնի արտաքին օտար մարմիններին: Բայց երբ այն չի աշխատում համապատասխան, այն կարող է հարձակվել սեփական օրգանիզմի վրա: Այն հիվանդությունները, որոնք առաջանում են այս մեխանիզմով, կոչվում են ատուտիմունային հիվանդություններ: Երբ իմունային համակարգը հարձակվում է սեփական օրգանիզմի վրա, այն հնարավոր է առաջացնի հոդացավ, հոդի այտուց, շարժումների սահմանափակում և արագ հոգնածություն:

Ի՞նչ է ԻԼ-6?

Ինտերլեյկին-6ը (ԻԼ-6) սպիտակուց է, որը առաջանում է իմունային համակարգում: Օրգանիզմը օգտագործում է ԻԼ-6ը դեկավարելու բորբոքումը և վարակները:

Ի՞նչ է ակտեմրան:

Ակտեմրան բիոլոգիական դեղ է (ստացվում է կենդանի բջիջներից, որոնք հետո իրականացնում են բուժումը), որը պարունակում է ակտիվ նյութ՝ տոցիլիզումաբ, սպիտակուց, որը ստացվում է սպեցիֆիկ իմունային բջիջներից (մոնոկլոնալ հակամարմիններից), որոնք խափանում են սպեցիֆիկ սպիտակուցի՝ ցիտոկինի (ինտերլեյկին ԻԼ -6) գործունեությունը: Ակտեմրան օգտագործում են բուժելու պՅԻԱ – ը երեխաների մոտ:

Ինչպե՞ս է ակտեմրան հետազոտվել պՅԻԱՅ-ի ժամանակ:

Ակտեմրան հետազոտվել է երեխաների մոտ , որոնք ունեն պՅԻԱ: Այն հետազոտվել է պՅԻԱյի ինչպես մեթոտրեքսատի հետ զուգընթաց բուժման մեջ, այնպես էլ մոնոթերապիայում:

Ինչպես է ակտեմրան օգտագործվում պՅԻԱՅի ժամանակ:

Ակտեմրան օգտագործվում է բուժելու 2 տարեկան և ավելի երեխաների մոտ, որոնք ունեն պոլիարտիկուլյար յուվենիլ իդիոպատիկ արթրիտ: Այն բորբոքային հիվանդություն է, որը առաջացնում է մեկ և ավելի հոդացավ և այտուց:

Ակտեմրան օգտագործվում է բարելավելու պՅԻԱյի ախտանիշները: Այն կարելի է նշանակել մետոտրեքսատի հետ զուգընթաց կամ առանձին:

Ակտեւրան չի հետազոտվել բիոլոգիական այլ դեղերի զուգընթաց պՅԲԱյի բուժման մեջ:

Քանի որ ակտեւրայի բուժման ժամանակ հնարավոր է բարձրանա վարակների առաջացման հավանականությունը, այն չպետք է նշանակվի այլ բիոլոգիական դեղերի հետ զուգընթաց՝ նախատեսված պՅԲԱյի բուժման համար: Այդ դեղերն են. Էնրբել[®] (էտաներցեպտ), հումիրա[®] (ադալիմումաբ), Ռեմիկեյդ[®] (ինֆլիքսիմաբ), մաբթերա[®] (ռիտուքսիմաբ), օրենցիա[®] (աբատացեպտ), կիներետ[®] (անակիրա), ցիմզիա[®] (ցերտոլիզումաբ պեգոլ) և սիմպոնի[®] (զոլիմումաբ)¹:

¹Էնրբելը՝ Ամգեն և Պֆայզեր կազմակերպությունների կողմից գրանցված դեղն է; Հումիրան՝ ԱԲԲՎԻ; Ռեմիկեյդը՝ Շերինգ-Պլաու կորպորացիայի; Մաբթերան՝ Հոֆֆմանն-Լյա Ռոշե ՍՊԸ-ի; Օրենցիան՝ Բրիստոլ Մայերս Սքվիբի; Կիներետը՝ Ամգենի; Ցիմզիան՝ Յու Սի Բի կազմակերպությունների խմբի; Սիմպոնին՝ Շերինգ-Պլաու և Ցենտոկոր կազմակերպությունների:

Ինչպե՞ս է ակտեմբան նշանակվում պՅԻԱյի ժամանակ:

*Ակտեմբան նշանակվում է ներերակային (երակի մեջ) (Ն/Ե) ներարկման ձևով:
Ընդունման ձևերի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար տե՛ս ստորև ներկայացրած համապատասխան մասը:*

Ակտեմբայի ն/ե ներարկման նշանակման ձևը

- Ձեր երեխայի բժիշկը կնաշանկի ակտեմբան ն/ե
- Մեկ դեղաչափի ընդունումը կտևի մոտավորապես 60 րոպե, ամենայն հավանականությամբ բազկի երակի մեջ:
- Դեղաչափը կախված է ձեր երեխայի մարմնի զանգվածից, այսպիսով, դեղաչափը հնարավոր է փոխվի բուժման ընթացքում:
- Ն/ե ակտեմբան նշանակվում է ամեն 4 շաբաթը մեկ անգամ

Կարևոր է, որ ձեր երեխան բաց չըողնի հերթական դեղաչափը: Եթե դա տեղի ունենա, կապվեք ձեր երեխայի բուժող բժշկի կամ բուժքրոջ հետ: Նա խորհուրդ կտա, թե երբ ընդունել հաջորդ դեղաչափը:

Ինչպիսի՞ հետազոտություններ պետք է անել երբ ստանում են ակտեմբայիով բուժումը:

Բժշկի, բուժքրոջ ամեն այցի ժամանակ ձեր երեխային կնշանակվի արյան հետազոտություններ՝ նրա բուժման մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու համար: Այդ հետազոտությունները հնարավոր է լինեն ստորև ներկայացվածները.

- **Նեյտրոֆիլների հետազոտություն.** բավարար քանակի նեյտրոֆիլներ ունենալը կարևոր է օգնելու պայքարել ձեր օրգանզիմին վարակների դեմ: Ակտեմբան ազդում է իմունային համակարգի վրա՝ իջեցնելով նեյտրոֆիլների, արյան սպիտակ բջիջների, քանակը: Այս պատճառով, ձեր բժիշկը հնարավոր է ստուգի արդյոք ձեր երեխան ունի բավարար քանակի նեյտրոֆիլներ և վերահսկի վարակի ախտանիշների առկայությունը:
- **Թրոմբացիտներ.** տրոմբոցիտները արյան փոքր բջիջներ են, որոնք դադարեցնում են արյունահոսությունը՝ առաջացնելով թրոմբ: Որոշ մարդկանց մոտ ակտեմբայի օգտագործումը առաջացնում է թրոմբոցիտների քանակի անկում: Կլինիկական հետազոտություններում, թրոմբոցիտների քանակի իջեցումը չի գուգորդվել որևէ լուրջ արյունահոսությունների հետ:
- **Լյարդի էնզիմներ.** Լյարդի էնզիմները սպիտակուցներ են, որոնք արտադրվում են լյարդում, որը տեղովորվում է արյուն, ինչը որոշ դեպքերում համարվում է լյարդի քայքայման ցուցանիշ: Որոշ մարդկանց մոտ, որոնք ընդունել են ակտեմբա, նկատվել է լյարդի էնզիմների քանակի բարձրացում, ինչը հնարավոր է լինի լյարդի վնասման նշան: Լյարդի էնզիմների քանակի բարձրացումը ավելի հաճախ հանդիպել է այն ժամանակ, երբ ակտեմբան նշանակվել է լյարդի համար վնասակար դեղերի հետ

միասին: Եթե դա տեղի ունենա, ձեր բժիշկը պետք է վերահսկի դա: Նա հնարավոր է վերանայի ակտեմրայի կամ այլ դեղի դեղաչափը, կամ դադարեցնի ակտեմրայի և/կամ այդ դեղի ընդունումը:

• **Խոլեստերոլ**, որոշ մարդկանց մոտ, որոնք ընդունել են ակտեմրա, հանդիպել է խոլեստերոլի մակարդակի բարձրացում արյան մեջ: Եթե այդ տեղի ունենա, ձեր բուժող բժիշկը հնարավոր է նշանակի խոլեստոլի իջեցնող բուժում:

Կարո՞ղ են հիվանդները, որոնք ստանում են ակտեմրա, պատվաստվել:

Ակտեմրան դա դեղ է, որը ազդում է իմունային համակարգի վրա և իջեցնում է մարմնի դիմադրողականությունը վարակների դեմ: Կենդանի կամ կենդանի-ատենուացված պատվաստանյութերով (որոնք պարունակում են քիչ քանակի կենդանի կամ թուլացած մանրէներ), ինչպիսին է գրիպի դեմ պատվաստումը, չպետք է նշանակվի ակտեմրայի բուժման ժամանակ: Հիվանդները պետք է ստանան բոլոր նախատեսված պատվաստումները մինչև բուժումն սկսելը:

Որո՞նք են ակտեմրայի հետ կապված հիմնական կողմնակի ազդեցությունները:

Հետազոտություններում հիմնական կողմնակի ազդեցությունները, որոնք հանդիպել են ակտեմրայով բուժման ընթացքում, սովորաբար եղել են միջին ծանրության և չեն պահանջել բուժման ընդհատում: Հիմնական կողմնակի ազդեցության դեպքերն են.

- Վերին շնչուղիների վարակներ (բնորոշ ախտանիշներով, ինչպիսիք են հազը, քթարդադրություն, կոկորդի ցավ, բորբոքումը, գլխացավը)
- Մրսածություն
- Գլխացավ
- Արյան բարձր ճնշում
- Քոր
- Հոգնածություն
- Ներարկման տեղի ռեակցիաներ (հիմնականում ենթամաշկային ներարկման ժամանակ)

Որո՞նք են ակտեմրայի կողմնակի ազդեցությունները:

Վարակներ. Ակտեմրան դեղ է, որը ազդում է հիվանդի իմունային համակարգի վրա: Իմունային համակարգը կարևոր է, քանի որ այն օգնում է հիվանդին պայքարելու վարակների դեմ: Հիվանդի կարողությունը պայքարելու վարակի դեմ հնարավոր է լինի իջեցված ակտեմրայով բուժման ժամանակ: Լուրջ վարակները հնարավոր է պահանջեն հատուկ բուժում և հոսպիտալացում, ինչպես նաև որոշ դեպքերում նաև լինեն մահվան պատճառ: Շատ կարևոր է, որ դուք անմիջապես տեղեկացնեք Ձեր բժշկին կամ բուժքրոջը ցանկացած վարակի նշանների դեպքում:

Անմիջապես դիմեք բժշկի, եթե դուք կամ ձեր հիվանդը նկատել էք ստորև ներկայացրած ինֆեկցիայի նշաններից որևէ մեկը՝

- Տենդ կամ դող
- Կայուն հազ

- Մարմնի զանգվածի կորուստ
- Կոկորդի ցավ կամ բորբոքում
- Հնոց
- Մաշկի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կարմրում, այտուց կամ վերքեր
- Ծանր թուլություն, հոգնածություն
- Ստամոքսի ցավ

Ալերգիկ ռեակցիաներ, հիմնական ալերգիկ ռեակցիաները տեղի են ունենում ակտեմրայի ներարկումից 24 ժամվա ընթացքում, չնայած որ հնարավոր է զարգանան ցանկացած ժամանակ: Լուրջ ալերգիկ ռեակցիաները, ներառյալ անաֆիլաքսիան, արձանագրվել են ակտեմրայի ներարկման ժամանակ: Այսպիսի ռեակցիաները հնարավոր են լինել ավելի ծանր, և պոտենցիալ մահացու այն հիվանդների մոտ, որոնք ունեցել են ալերգիկ ռեակցիաներ ակտեմրայի նախորդ ներարկման ժամանակ:

Ն/Է ներարկում (հիվանդանոցում)
Ներարկման ժամանակ, ձեր բժիշկը կամ բուժքույրը կհետևի ալերգիկ ռեակցիայի որևէ նշան հայտնաբերելու համար:
Եթե անաֆիլաքսիկ ռեակցիա կամ այլ լուրջ ալերգիկ ռեակցիա հայտնաբերվի, ակտեմրայի ներարկումը պետք է անմիջապես ընդհատվի, համապատասխան բուժում նշանակվի, իսկ ակտեմրայի նշանակումը ընդմիջտ կհանվի:

Դիմեք բժշկի , եթե ակտեմրայի ընդունման ժամանակ նկատեք ստորև ներկայացրած ալերգիկ ռեակցիաներից որևէ մեկը.

- Քոր, ցան կամ եղնջացան
- Շնչառության վատացում կամ ծանրություն
- Շրթունքների, լեզվի կամ դեմքի այտուց
- Կրծքավանդակի ցավ
- Գլխապտույտ կամ թուլություն
- Սուր որովայնացավ կամ սրտխառնոց
- Արյան ճնշման անկում

Չընդունեք հաջորդ դեղաչափը, մինչև որ չտեղեկացնեք ձեր բժշկին, որ դուք կամ ձեր երեխան ունեցել է որևէ ալերգիկ ռեակցիա ակտեմրայի ներարկումից հետո և ձեր բժիշկը թույլ չտա դեղաչափի ընդունումը:

Որովայնացավ. հիվանդները , որոնք ընդունել են ակտեմրա հազվադեպ ունեցել են լուրջ կողմնակի ազդեցություն իրենց ստամոքսի կամ աղիների վրա: Նշաններից են եղել են տենդը երկարատև ստամոքսացավի հետ, որը ընթացել է աղիների ֆունկցիայի փոփոխումով: Դիմեք բժշկի, եթե դուք կամ ձեր երեխան ունեցել եք ստամոքսացավ կամ կոլիկներ, կամ եթե նկատել եք արյուն կղանքի մեջ:

Նորագոյացություններ. բժշկական դեղերը, որոնք ազդում են իմունային համակարգի վրա, ինչպիսին է ակտեմրան, հնարավոր է բարձրացնեն նորագոյացության առաջացման հավանականությունը:

Ամփոփում և կոնտակտային տեղեկություն

Այս պՅԻԱ գրքույկը պարունակում է ակտեմրային վերաբերյալ որոշակի բայց շատ կարևոր տեղեկություն: Դեղերը երբեմն նշանակվում են այլ պատճառների համար: Մի օգտագործեք ակտեմրան այն դեպքերի ժամանակ, երբ այն ցուցված չէ:

Տեղեկացրե՛ք ձեր բժշկին կամ դեղագետին ցանկացած կողմնակի ազդեցության մասին, որը ձեզ անհանգստացնում է: Այս գրքույկում նշված կողմնակի ազդեցության դեպքերը, կապված ակտեմրայի ընդունման հետ բոլորը չեն: Հարցրեք ձեր բժշկին, բուժքրոջը կամ դեղագետին հավելյալ տեղեկատվության համար:

Զրուցե՛ք բժշկի, բուժքրոջ կամ դեղագետի հետ, եթե քուք ունեք որևէ հարցեր կամ խնդիրներ:

Կողմնակի ազդեցության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության համար տես “Դեղի ընդհանուր բնութագիր”-ը կամ ներդիր թերթիկը, որոնք հասանելի են ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Է. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴԵՂԵՐԻ և ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ- ի կայքում, հետևյալ հղումով. www.pharm.am:

Կամ կարող եք հաղորդել նաև ստորև ներկայացված կոնտակտային տվյալներով.

ՖարմաՏեք ՄՊԸ-ի դեղերի անվտանգության բաժին՝ Հոֆֆմանն-Լյա Ռոշե ընկերության դեղերի անվտանգության պատասխանատու՝ Գայանե Ղազարյանին, հետևյալ բջջային հեռախոսահամարով. +37491796688, կամ անվտաբնգության մասնագետի փոխարինող՝ Ռիմա Դավթյանին. +374 10 734643 հեռախոսահամարով կամ գրել է/նամակ, էլ.հասցեյով. gayaneh.ghazarvan@gmail.com (rima@pharmatech.am), ինչպես նաև ուղղել Ձեր հաղորդակցությունը Ռոշե Մոսկվա դեղերի անվտանգության բաժին՝ էլ.հասցե. moscow.ds@roche.com, բջջ. հեռ. +7-495-229 2999, ֆաքս: +7-495- 229 7999 կամ փորձեք կայք. www.roche.ru.

Զանգահարեք՝

ՖարմաՏեք ՄՊԸ անվտանգության բաժնի Հոֆֆմանն-Լյա Ռոշե ընկերության դեղերի անվտանգության պատասխանատու՝ Գայանե Ղազարյանին, հետևյալ բջջային հեռախոսահամարով. +37491796688 կամ է.հասցեյով. gayaneh.ghazaryan@gmail.com

պՅԻԱ –ով հիվանդների համար անհրաժեշտ պարագաներ

Մինչև ակտեմբայի ընդունումը, խնդրում ենք կարդալ ստորև ներակայացված տեղեկությունը:


Ակտեմբան հնարավոր է չլինի հենց ձեզ համար: Մինչև ակտեմբայի սկսկելը, խնդրում ենք ուսումնասիրել ստորև ներկայացրած տեղեկությունը , և հայտնեք ձեր բժշկին, եթե դուք պատասխանել եք <<ԱՅՈ>> ստորև ներկայացրած հարցերին.


	ԱՅՈ	ՈՉ
Վարակներ		
Դուք կամ ձեր երեխան ունե՞ք վարակ կամ ձեզ վատ ե՞ք զգում: (վարակների նշանները կարող են լինել՝ տենդ, հազ, բաց վերքեր կամ ցան (ջրծաղկի նման ցան կամ թեպոտում))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան բուժվել ե՞ք վարակների դեմ կամ ունե՞ք վարակ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել ե՞ք տուբերկուլոզ կամ եղել ե՞ք սերտ կոնտակտի մեջ տուբերկուլոզով հիվանդնի հետ: (Ձեր բժիշկը կփորձի համոզվել, որ դուք կամ ձեր երեխան չունեք ՏԲ մինչև ակտեմբայի ներարկումը)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել եք կամ ստացել եք բուժում վիրուսային հեպատիտի կամ այլ լայրդի հետ կապված հիվանդության դեմ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել եք շաքարախտ կամ այլ հիվանդություն, որը կարող է բարձրացնել վարակների զարգանալու հավանականությունը:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ալերգիկ ռեակցիաներ		
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել ե՞ք ալերգիկ ռեակցիաներ նախորդ դեղերը (ներառյալ ակտեմբան) ստանալուց:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ստամոքս – աղիքային բարդություններ		
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել ե՞ք աղիքային խոցային հիվանդություն կամ դիվերտիկուլիտներ: (Նախանշանները հնարավոր է ներառեն որովայնացավը, կամ աղիների ֆունկցիայի անսպասելի փոփոխություն՝ տենդով):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Բժշկական պատմություն		
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել է՞ք թոքի ֆունկցիայի խանգարումներ: (Օրինակ՝ ինտերստիցիալ թոքի հիվանդություն, որը դժվարացում է թթվածնի ստանալը)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան բուժվել է՞ք քաղցկեղի համար:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել եք սրտային կամ արյան շրջանառության խանգարումներ: (Օրինակ՝ արյան բարձր ճնշում կամ խոլեստերոլի մակարդակի բարձրացում)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել է՞ք երիկամների հիվանդություն:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել էք կայուն գլխացավ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Հղիություն		
Դուք կամ ձեր երեխան ունեք հղիություն, կամ մտադիր եք հղիանալ: (Այն կանայք, որոնք ունեն երեխա բերելու պոտենցյալ պետք է կիրառեն արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ բուժման ընթացքում (մինչև 3 ամիս և դրանից հետո: Ակտեմրան չպետք է նշանակվի, եթե բացարձակ ցուցված չէ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Դուք կամ ձեր երեխան կրծքով կերարկում եք կամ մտադիր եք սկսել կրծքով կերարկումը: :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ղեղերը		
Դուք կամ ձեր երեխան ունեցել էք պատվաստումներ, ինչպիսիսիք են գրիպի դեմ պատվաստումը կամ այլ պլանավորված պատվաստումներ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ակտեմրան կարող է փոխազդել որոշ ղեղերի հետ: Այս փաստը կարող է ազդել ձեր կամ ձեր երեխայի համաար հաշվարկված դեղաչաձի վրա: Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե դուք կամ ձեր երեխան ստանում եք հետևյալ ղեղերը.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-աստրվաստատին, որը օգտագործում են խոլեստերոլի իջեցման համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-կալցիումի կանալների բլոկատորներ (օրինակ՝ ամլոդիպին,) որոնք օգտագործվում են արյան բարձր ճնշումը բուժման համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-թեոֆիլին՝ ասթմայի համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- վարֆարին՝ արյունը նոսրացնելու համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-ֆենիտոին՝ կոնվուլսաների բուժման համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-ցիկլոսպորիններ՝ իմունային համակարգը ճնշող ղեղեր՝ նշանակվող օրգանների տրանսպլանտացիաների ժամանակ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-բենզոդիազեպիններ (օրինակ տեմզեպամ)՝ իջեցնելու անհանսգտությունը	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Ցանկացած այլ ղեղեր ցուցված պՅԻԱ-յի համար	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Ոչ բիոլոգիական ղեղեր		
o մետոտրեքսատ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o լեֆլունոմիդ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Բիոլոգիական ղեղեր		
o Էտաներգեպտ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o ադալիմումաբ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o ինֆլիքսիմաբ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o ռիտուքսիմաբ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o աբատացեպտ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o անակիրա	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o ցերտոլիգումաբ պեգոլ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o գոլիմումաբ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Դուք կամ ձեր երեխան ընդունում ե՞ք այլ դեղեր: (Տեղեկացրեք ձեր բժշկին կամ բուժքրոջը այն դեղերի մասին, որը դուք ստանում եք: Այն ներառում է դեղատոմսով և ոչ դեղատոմսով դորս գրվող դեղեր, վիտամիններ և խոտաբույսեր):</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Այս ուսուցողական նյութերը պարտադիր են, եթե ակտմերան գրանցված է՝ նվազեցնելու համար կարևոր վտանգների զարգացումը ակտեմրայով բժման ժամանակ:

Վահան Արուշանյան,
Գլխավոր տնօրեն, ՖարմաՏեք ՓԲԸ 27.11.18
ամսաթիվ /  ստորագրություն

Գայանե Ղազարյան
Հայաստանում Ռոշե դեղերի անվտանգության
պատասխանատու 26.11.18
ամսաթիվ /  ստորագրություն