



Создавая вместе здоровый мир

ООО «Пфайзер Инновации»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
тел.: +7 495 2875000
факс: +7 495 2875300

В связи с возможным повышением риска рецидивов тромботических осложнений у пациентов с антифосфолипидным синдромом не рекомендуется применение препаратов группы прямых пероральных антикоагулянтов (ППОАК)

Уважаемый Специалист здравоохранения,

- Компания Пфайзер по поручению Европейского медицинского агентства и Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна» АОЗТ хотела бы проинформировать Вас о следующем:
- У пациентов с диагностированным антифосфолипидным синдромом (АФС) и тромбозами в анамнезе применение ривароксабана было связано с повышением риска рецидива тромботических событий по сравнению с варфарином. Подобное увеличение риска тромботических событий по сравнению с antagonистами витамина К возможно свойственно и другим ППОАК.
- **ППОАК не рекомендуются пациентам с АФС, особенно пациентам с высоким риском** (при наличии положительных результатов всех трех антифосфолипидных тестов на выявление волчаночного антикоагулянта, антикардиолипиновых антител и антител к бета 2 гликопротеину I).
- Пересмотрите лечение у пациентов с АФС, получающих в настоящее время ППОАК для профилактики тромбоэмбологических осложнений, особенно при наличии высокого риска, и, при необходимости, переведите этих пациентов на прием antagonista витамина К.



Создавая вместе здоровый мир

ООО «Пфайзер Инновации»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
тел.: +7 495 2875000
факс: +7 495 2875300

Общая информация о проблеме безопасности

Уровень доказательности повышения риска рецидива тромботических событий у пациентов с диагностированным АФС различается среди имеющихся в продаже прямых пероральных антикоагулянтов (ППОАК). В настоящее время нет достаточных данных о том, что какой-либо ППОАК обеспечивает достаточную защиту у пациентов с подтвержденным АФС, особенно у пациентов с высоким риском развития тромбоэмбологических осложнений. Использование ППОАК у этих пациентов не рекомендуется.

Ривароксабан: В исследовании, инициированном исследователем, по рандомизированному открытому многоцентровому дизайну (TRAPS, www.clinicaltrials.gov #NCT02157272; Blood. 2018 Sep 27; 132 (13): 1365-1371) ривароксабан сравнивали с варфарином у пациентов с диагностированным АФС и тромбозом в анамнезе и с высоким риском тромбоэмбологических осложнений (устойчиво положительный результат всех трех антифосфолипидных тестов). Исследование было прекращено досрочно после включения 120 пациентов из-за повышения риска тромбоэмбологических осложнений у пациентов в группе ривароксабана. Тромбоэмбологические осложнения были отмечены у 12% пациентов, рандомизированных для получения ривароксабана (4 случая ишемического инсульта и 3 случая инфаркта миокарда). У пациентов, получавших варфарин, не было зарегистрировано тромбоэмбологических осложнений. Массивное кровотечение произошло у 4 пациентов (7%) в группе пациентов, принимавших ривароксабан и у 2 пациентов (3%) в группе варфарина.

Данные для апиксабана и других препаратов группы ППОАК у пациентов с АФС ограничены из-за отсутствия завершенных клинических исследований. В настоящее время продолжается исследование, инициированное исследователем ASTRO-APS - апиксабан для вторичной профилактики тромбоза у пациентов с антифосфолипидным синдромом. Его результаты пока не доступны.

Дополнительная информация

Зарегистрированные показания для применения у взрослых ППОАК включают лечение и профилактику рецидива венозной тромбоэмболии (ВТЭ) и профилактику инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий с дополнительными факторами риска, профилактику ВТЭ после эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава.

Планируется внесение информации о применении апиксабана у пациентов с АФС в Инструкцию по применению.

Просьба о сообщении нежелательных реакций

Медицинских работников просят сообщать о любых предполагаемых нежелательных реакциях в ООО Пфайзер, тел: +74952875000.



Создавая вместе здоровый мир

ООО «Пфайзер Инновации»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
тел.: +7 495 2875000
факс: +7 495 2875300

Можете также выслать информацию в Отдел безопасности «Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна» по следующему адресу; пр. Комитаса 49/4, Ереван 0051, РА, тел: +37410231682 (внутр. 123), горячая линия + 37410200505; эл. Адрес vigilance@pharm.am или веб сайт -www.pharm.am

Контактное лицо компании

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со службой медицинской информации тел: +74952875000.

Представитель компании

Татьяна Прохорова, к.м.н.

УЛФ ЕАЭС/Украина, Руководитель Регионального Кластера по фармаконадзору.

ООО Пфайзер Инновации, Россия, 123112, Москва, Пресненская наб. 10

БЦ «Башня на набережной» (Блок С)

Тел (офис): + 7 (495) 287-53-43 (прямой)

Тел (моб, 24/7): +7 (985) 222-61-45; Фах: 8 800 100 6305

E-mail: Tatyana.Prokhorova@pfizer.com