



Ինչ է պետք իմանալ Մաբթերա® դեղի մասին

Կարևոր տեղեկություն Մաբթերա® ստացող պացիենտների (կամ նրանց խնամողների) համար

- Այս գրքույկը պարունակում է միայն դեղի անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկություն
- Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ Մաբթերա® դեղի ներդիր թերթիկից

Գրքույկի մասին

Այս գրկույկի տեղեկությունը նախատեսված է այն պացիենտների (կամ նարանց ինամոդների) համար, որոնք ստանում են Մաթթերա ռևմատոիդ արթրիտի, պոլիանգիտի հետ ընթացող գրանուլոմատոզի կամ միկրոսկոպիկ պոլիանգիտի բուժման համար: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս գրքույկը՝ դա կարևոր է, քանի որ Դուք պետք է իմանաք Մաթթերա դեղի օգտագործման ժամանակ օգուտների և վտանգների մասին:

Այս գրքույկը կարող է.

- Պատասխանել Ձեր այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են Մաթթերայի պոտենցիալ վտանգներին: Այն կօգնի Ձեզ և Ձեր բժշկին հասկանալ արդյոք ճիշտ բուժում է նշանակված
- Կպատմի Ձեզ Մաթթերայի մասին
- Կպատմի այն ամենը, ինչը պետք է իմանալ մինչև Մաթթերայի ներարկումը
- Կպատմի Ձեզ Մաթթերայի կողմնակի ազդեցության մասին, որը կենտրոնական նյարդային համակարգի հազվադեպ հանդիպող, բայց լուրջ վարակ է և կոչվում է **պրոգրեսիվոդ մուլտիֆոկալ լեյոնոցեֆալոպաթիա** (ՊՄԼ)
- Կպատմի Ձեզ ինչպիսին են այդ հիվանդության նշանները
- Կպատմի Ձեզ թե ի՞նչ անել, եթե Ձեզ մոտ զարգանա վարակ կամ ՊՄԼ

Ի՞նչ է պետք իմանալ Մաթթերայի մասին

Մաթթերան ազդում է Ձեր իմունային համակարգի վրա, այն դարձնում է ավելի զգայուն վարակի նկատմամբ: Որոշ վարակներ կարող են լինեն ծանր և առաջանա բուժման անհրաժեշտություն:

Ինչի՞ համար է օգտագործվում Մաթթերան

Մաթթերան օգտագործվում է իմունային համակարգի տարբեր հիվանդությունների բուժման համար:

- Սովորաբար այն նշանակում են ստերոիդների հետ:
- Մաթթերայի օգտագործման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարդացեք դեղի օգտագործման հրահանգը

Ինչպե՞ս օգտագործել Մաթթերան

Մաթթերան օգտագործվում է ներերակային ներարկման ճանապարհով:

Ինչպես և այլ դեղերը, Մաթթերան կարող է առաջացնել կողմնակի ազդեցություն, սակայն ոչ բոլորի մոտ և հիմնականում ոչ ծանր:

- Եթե դուք ստանում եք Մաթթերա այլ դեղերի հետ գուգորդված, կողմնակի ազդեցությունները հնարավոր է պայմանավորված լինեն այլ դեղերով նույնպես:

- Կողմանակի ազդեցության որոշ դեպքեր հնարվոր է լինեն ծանր և պահանջեն բուժում: Հազվադեպ դեպքեր կարող են լինել կյանքին սպառնացող:

Եթե որևէ կողմանակի ազդեցություն դառնում է ծանր, խնդրում եք անմիջապես դիմեք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը:

Եթե Դուք ունեք այլ հարցեր, դիմե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը:

Պահեք Ձեզ մոտ Ձեր բոլոր ընդունվող դեղերի ցանկը : Հնարավոր է այն պետք լինի ցույց տալ Ձեր բուժումը վարող մասնագետին :

Մինչև Մաքթերա ստանալը

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը, եթե ունեք ստորև բերված նշաններից որևէ մեկը

Վարակներ

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը, եթե դուք.

- Ներկա պահին ունեք վարակ (նույնիսկ թեթև մրսաճության նման):
- Ձեր բժիշկը, դեղագետը կամ բուժքույրը հնարավոր է խորհուրդ տա հետաձգել Մաքթերայի ներարկումը մինչև լիարժեք ապաքինումը
- Ունեք կամ ունեցել եք նախկինում շատ վարակներ
- Ունեցել եք կամ ունեք ծանր տուբերկուլոզ, արյան վարակ (սեպսիս) կամ որևէ այլ պատճառ, որը հնարավոր է ընկճի Ձեր իմունային համակարգը
- Ունեք այնպիսի վիճակ, որը կնպաստի վարակին և բուժման անհրաժեշտություն կառաջացնի

Այլ իրավիճակներ

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը, եթե

- Ունեք սրտային հիվանդություններ
- Ունեք շնչառության հետ կապված խնդիրներ
- Հղի եք, կամ պատրաստվում եք հղիանալ, կամ կերակրում եք կրծքով
- Ունեք կամ երբևէ ունեցել եք վիրուսային հեպատիտ կամ լայրդի որևէ այլ հիվանդություն
- Ունեք, կամ ունեցել եք արյան կամ մեզի լաբորատոր հետազոտության տվյալների շեղումներ:

Դեղերի ընդունում

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը, եթե

- Ընդունում եք արյան ճնշումը կարգավորող դեղեր

- Ստանում եք կամ երբևէ ստացել եք դեղեր, որոնք ազդում են Ձեր իմունային համակարգի վրա, այսպես կոչված “իմունոսուպրեսանտներ” կամ քիմիաթերապևտիկ դեղեր: Այդ դեղերը հնարավոր է ընկճեն Ձեր իմունային համակարգը:
- Ստացել եք քիմիաթերապևտիկ դեղեր, որոնք հնարավոր է ազդեն Ձեր սրտի աշխատանքի վրա (կարդիոտոքսիկ քիմիաթերապիա)
- Ստացել եք կամ ներկա պահին ստանում եք որևէ այլ դեղ, ներառյալ այն դեղերը, որոնք ձեռք են բերված դեղատնից, սուպերմարկետից կամ այլ բուժհաստատություններից:

Պատվաստումներ

Մինչև Մաքթերայի ընդունումը տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը, եթե

- Կարծում եք, որ հնարավոր է պետք լինի պատվաստվել մոտակա ժամանակահատվածում, ներառյալ այնպիսի պատվաստումներ, որոնք անհրաժեշտ են այլ երկրներ ճանապարհորդելու համար:
Որոշ պատվաստումներ չպետք է ներարկվեն Մաքթերայի հետ զուգահեռ կամ Մաքթերայի վերջին ներարկումից մի քանի ամիս անց: Ձեր բժիշկը մինչև Մաքթերա նշանակելը պետք է ստուգի, կա արդյոք պատվաստում ստանալու անհրաժեշտություն:
- Ասե՛ք Ձեր բժշկին, եթե վերևում թվարկածներից որևէ մեկը համապատասխանում է Ձեր կարգավիճակին: Եթե վստահ չեք, որ կարող եք ստանալ Մաքթերա՝ խոսեք դրա մասին նրա հետ:

Մաքթերայով բուժման ընթացքում կամ դրանից հետո

Մաքթերան ազդում է Ձեր իմունային համակարգի վրա և հնարավոր է Ձեզ դարձնի վարակի հանդեպ ավելի խոցելի: Որոշ վարակներ հնարավոր է լինեն ծանր և պահանջեն բուժում:

Վարակներ

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը անմիջապես, եթե դուք ունեք ստորև ներկայացրած նշաններից որևէ մեկը.

- Մարմնի բարձր ջերմություն (տենդ) հարբուխի հետ կամ առանց հարբուխ
- Երկարատև հազ
- Մարմնի քաշի կորուստ
- Ցավ, առանց վնասվածքի
- Ընդհանուր վատ զգացողություն, հոգնածություն, կամ էներգիայի պակաս
- Այրող ցավ միզելու ժամանակ

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը անմիջապես, եթե դուք ունեք ներկայացրած վարակների նշաններից որևէ մեկը:

Կենտրոնական նյարդային համակարգի լուրջ

վարակ՝ պրոգրեսիվող մուլտիֆոկալ

լեյկոենցեֆալոպաթիա (ՊՄԼ)

Շատ հազվադեպ Մաբթերան կարող է առաջացնել կենտրոնական նյարդային համակարգի լուրջ վարակ, այսպես կոչված պրոգրեսիվող մուլտիֆոկալ լեյկոենցեֆալոպաթիա կամ ՊՄԼ: Այն կարող է բերել բավականին ծանր հաշմանդամության կամ լինել կյանքին սպառնացող:

ՊՄԼ-ն առաջացնում է վիրուսը: Հիմնականում առողջ մեծահասակների մոտ այս վիրուսը լինում է ինակտիվ և ոչ վնասակար: Հայտնի են այնպիսի դեպքեր, երբ այն դառնում է ակտիվ, և այդ դեպքերը կապված են իմունային համակարգի թուլացման հետ:

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը անմիջապես, եթե դուք ունեք ստորև ներկայացրած ՊՄԼ-ի նշաններից որևէ մեկը.

- Գիտակցության մթազնում, հիշողության կորուստ, մտածելու դժվարություններ
- Հավասարակշռության կորուստ կամ խոսելու կամ քայլելու խնդիրներ
- Մարմնի ուժի միակողմանի կորուստ կամ թուլություն
- Տեսողության վատացում կամ կորուստ

Տեղեկացրե՛ք Ձեր բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը անմիջապես, եթե Դուք ունեք այս ՊՄԼ-ի նշաններից որևէ մեկը Մաբթերայի բուժման ժամանակ կամ դրա վերջին ներարկումից հետո 2 տարվա ընթացքում :

Պացիենտի տեղեկատվական թերթիկ

Պացիենտի տեղեկատվական թերթիկը պարունակում է դեղի անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկություն, որը Դուք պետք է իմանաք մինչև Մաբթերա ստանալը, դրա ստացման ժամանակ կամ հետո:

- Ձեր բժիշկը, բուժքույրը կամ դեղագետը պետք է Ձեզ տրամադրեն Մաբթերայի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ ամեն ներակումից առաջ:
- Պահե՛ք այս տեղեկատվական թերթիկը Ձեզ մոտ պայուսակում կամ դրամապանակում:
- Ցույց տվե՛ք Պացիենտի տեղեկատվական թերթիկը ցանկացած մասնագետի, ով զբաղվում է Ձեր բուժման հարցերով: Դա կարող է լինել ոչ միայն Մաբթերա նշանակող մասնագետը, այլ նաև բուժքույր, դեղագետ, աստամնաբույժ՝ որոնց Դուք կարող եք այցելել: Պատմե՛ք Ձեր գուգրնկերոջը կամ խնամողին Ձեր բուժման մասին, և ցույց տվե՛ք նրան պացիենտի տեղեկատվական թերթիկը, քանի որ նրանք կարող է նկատեն նշաններ, որոնց Դուք ուշադրություն չեք դարձրել:
- Պահպանե՛ք պացիենտի տեղեկատվական թերթիկը Ձեզ մոտ Մաբթերայի վերջին ներարկումից հետո երկու տարի: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ Մաբթերայի ազդեցությունը

Խմուռնային համակարգի վրա հնարավոր է տեսել մի քանի ամիս, և կողմնակի ազդեցությունը կարող է ի հայտ գալ նույնիսկ, երբ Դուք արդեն չեք ընդունում դեղը:

Հավելյալ տեղեկության համար Դուք կարող եք դիմել Հոֆֆմանն- Լյա Ռոշե դեղերի բժշկական ղեկավար՝ Գայանե Ղազարյանին, հետևյալ հեռախոսահամարով. +37491796688 / կամ է.հասցե. gayaneh.ghazaryan@gmail.com; կամ Հայաստանում Հոֆֆմանն- Լյա Ռոշե դեղերի կոմերցիոն ղեկավար. Նունե Կարապետյանին, հետևյալ հեռախոսահամարով. +37491721154 / է.հասցե. nune.karapetyan.roche@gmail.com: ԻՆչպես նաև ուղարկել Ձեր հաղորդագրությունը Ռոշ Մոսկվա դեղերի անվտանգության բաժին. Է.հասցե. moscow.ds@roche.com, բջջ. հեռ. +7-495-229 2999, ֆաքս: +7-495- 229 7999, կամ փորձեք կայք. www.roche.ru

Դուք կարող եք նաև դիմել ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի հեռախոսահամարներով. +37410200505; +37496220505, կամ այցելել կայք, հետևյալ հղումով. www.pharm.am

Գայանե Ղազարյան
Հայաստանում Հոֆֆմանն- Լյա Ռոշե դեղերի
բժշկական ղեկավար



16.09.2020

Նունե Կարապետյան
Հայաստանում Հոֆֆմանն- Լյա Ռոշե դեղերի
կոմերցիոն ղեկավար

16.09.2020