



Էջ 1 5-ից

Քվինոլոնների , ֆտորքվինոլոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ , շնչառման հակաբիոտիկներ. աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև , պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկը , դրա հետ կապված օգտագործման սահմանափակումները

**Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի մասնագետներին ուղղված հաղորդագրություն**



MGF Group, agent of Bayer AG

Postal address:

0033 Yerevan, Armenia

Baghramyan 59

Tel.: +374 98 78 70 40

anna.babayan.ext@bayer.com

Քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ և շնչառման հակաբիոտիկներ. աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկը և դրա հետ կապված օգտագործման սահմանափակումները

*Առողջապահության ոլորտի հարգելի մասնագետներ,*

Համաշխարհային կարգավորող գործողությունների մասին առողջապահության մասնագետներին համակողմանիորեն տեղեկացնելու նպատակով «Բայեր ԱԳ» ընկերությունը ցանկանում է հայտնել քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ և շնչառման հակաբիոտիկների կիրառմամբ պայմանավորված աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկի և դրա հետ կապված այդ դեղերի օգտագործման սահմանափակումների վերաբերյալ Եվրոպական Միության (ԵՄ) երկրներում տիրող իրավիճակի մասին:

**Ամփոփագիր**

- Հաղորդվել է քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ և շնչառման հակաբիոտիկների կիրառմամբ պայմանավորված աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների մասին,

\*ՀՀ տարածքում գրանցված են հետևյալ առևտրային անուններով դեղերը. Ավելոքս (մոքսիֆլոքսացին) 400 մգ թաղանթապատ դեղահատեր և Յիպրոբայ (ցիպրոֆլոքսացին) 500մգ թաղանթապատ դեղահատեր:

Էջ 2 5-ից

Քվիտոնների և ֆտորքվիտոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ և շնչառման հակաբիոտիկներ. աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկը և դրա հետ կապված օգտագործման սահմանափակումները



որոնք հիմնականում վերաբերում են հենաշարժական և նյարդային համակարգերին:

- Դրա արդյունքում Եվրոպական Միության բոլոր երկրներում վերանայվել են քվիտոնների և ֆտորքվիտոնների դասին պատկանող բոլոր հակաբիոտիկների կիրառման օգուտն ու ռիսկերը, ինչպես նաև դրանց ցուցումները:
- Ցինօքսացին, ֆլյումեքվին, նալիդիքսաթթու և պիպեմիդաթթու պարունակող դեղերը շուկայից հետ կկանչվեն:
- Քվիտոնների և ֆտորքվիտոնների դասին պատկանող հակաբիոտիկները չի կարելի նշանակել՝

- ոչ ծանր կամ տեղային վարակների բուժման համար (օրինակ՝ ֆարինգիտ, տոնզիլիտ և սուր բրոնխիտ),
- ճանապարհորդների փորլուծությունը կամ ստորին միզուղիների վարակի կրկնությունը (ռեցիդիվ) կանխարգելելու համար,
- ոչ բակտերիային վարակների, այդ թվում՝ ոչ բակտերիային (քրոնիկական) պրոստատիտի բուժման համար,
- թեթև և միջին աստիճանի ծանրության վարակների բուժման համար (ներառյալ՝ չբարդացած ցիստիտ, քրոնիկական բրոնխիտի և թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության սրացում, սուր բակտերիային ռինոսինուսիտ և միջին ականջի սուր բորբոքում), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարակների բուժման համար սովորաբար խորհուրդ տրվող հակաբիոտիկները համարվում են անհամապատասխան,

\*ՀՀ տարածքում գրանցված են հետևյալ առևտրային անուններով դեղերը. Ավելօքս (մոքսիֆլօքսացին) 400 մգ թաղանթապատ դեղահատեր և Ցիպրոբայ (ցիպրոֆլօքսացին) 500մգ թաղանթապատ դեղահատեր:



MGF Group, agent of Bayer AG

Postal address:

0033 Yerevan, Armenia

Baghramyan 59

Tel.: +374 98 78 70 40

anna.babayan.ext@bayer.com



Էջ 3 5-ից

Քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ և շնչառման հակաբիոտիկներ. աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկը և դրա հետ կապված օգտագործման սահմանափակումները

- այն պացիենտներին, ովքեր նախկինում քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող հակաբիոտիկներ կիրառելիս ունեցել են լուրջ կողմնակի ազդեցություններ:
- Այս դեղերը **հատուկ զգուշությամբ** պետք է նշանակել տարեց պացիենտներին, երիկամների ֆունկցիայի խանգարում ունեցող պացիենտներին, օրգանների փոխպատվաստման ենթարկված պացիենտներին և կորտիկոստերոիդներ ընդունող պացիենտներին, քանի որ տենդինիտի առաջացման և ֆտորքվինոլոնային հակաբիոտիկների օգտագործման հետևանքով ջլերի պատվածքի առաջացման ռիսկը այս պացիենտների շրջանում կարող է բարձր լինել: Անհրաժեշտ է խուսափել կորտիկոստերոիդների հետ ֆտորքվինոլոնների միաժամանակյա կիրառումից:
- Պացիենտներին պետք է խորհուրդ տալ **ընդհատել** քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող հակաբիոտիկներով բուժումը լուրջ կողմնակի ազդեցությունների առաջին իսկ ախտանիշերի դեպքում, օրինակ՝ **տենդինիտ և ջլերի պատվածք, մկանացավ, մկանների թուլություն, հոդերի ցավ, հոդերի այտուց, ծայրամասային նեյրոպաթիա և կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդեցություն, և դիմել բուժող բժշկին՝ հետագա խորհրդատվության համար:**

*Անվտանգության վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ*

Դեղերի եվրոպական գործակալությունը (European Medicines Agency) դիտարկել է քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող համակարգային և շնչառման հակաբիոտիկների կիրառմամբ պայմանավորված, առավելապես հենաշարժական և նյարդային համակարգերի վրա ազդող լուրջ, երկարատև (ամիսներ կամ տարիներ

\*ՀՀ տարածքում գրանցված են հետևյալ առևտրային անուններով դեղերը. Ավելոքս (մոքսիֆլոքսացին) 400 մգ թաղանթապատ դեղահատեր և Ցիպրոբայ (ցիպրոֆլոքսացին) 500մգ թաղանթապատ դեղահատեր:

**Էջ 4 5-ից**

**Քվինոլոնների ֆտորքվինոլոնների\* դասին պատկանող համակարգային ազդեցությամբ ֆ 2նչառման հակաբիոտիկներ. աշխատունակության կորստի հանգեցնող երկարատև ֆ պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների զարգացման ռիսկը ֆ դրա հետ կապված օգտագործման սահմանափակումները**



տևող) աշխատունակության կորստին հանգեցնող և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների առաջացման ռիսկեր:

Հենաշարժական համակարգի լուրջ կողմնակի ազդեցություններն են՝ տենդինիտ, ջլերի պատռվածք, մկանացավ, մկանների թուլություն, հոդացավ, հոդերի այտուց և քայլվածքի խանգարումներ:

Ծայրամասային և կենտրոնական նյարդային համակարգի լուրջ կողմնակի ազդեցություններն են՝ ծայրամասային նեյրոպաթիա, անքնություն, դեպրեսիա, հոգնածություն, հիշողության թուլացում, տեսողության, լսողության, հոտառության և համի խանգարումներ:

Հաղորդվել է աշխատունակության կորստի հանգեցնող և պոտենցիալ անդարձելի կողմնակի ազդեցությունների միայն մի քանի դեպքերի մասին, բայց կարելի է ենթադրել տեղեկությունների ոչ լիարժեք տրամադրման մասին: Ելնելով նախկինում առողջ պացիենտների շրջանում առաջացած կողմնակի ազդեցությունների ծանրությունից, քվինոլոնների և ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող դեղերի նշանակման ցանկացած որոշում պետք է ընդունել յուրաքանչյուր դեպքի համար՝ ռիսկ-օգուտ հարաբերակցության մանրամասն գնահատումից հետո:

Ֆտորքվինոլոնների դասին պատկանող Ավելօքս դեղի օգտագործման հրահանգը Հայաստանում լրամշակվել է՝ համաձայն նոր տեղեկությունների:

***Կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման կոչ***

Հիշեցնում ենք, որ կասկածելի կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ է հաղորդել ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն. հասցե՝ Հայաստան, 0051 Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4, հեռախոսահամարներ՝ (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-16-82, թեժ գիծ՝ (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 22-05-05, էլ.հասցե՝ [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am) :

\*ՀՀ տարածքում գրանցված են հետևյալ առևտրային անուններով դեղերը. Ավելօքս (մոքսիֆլօքսացին) 400 մգ թաղանթապատ դեղահատեր և Ցիպրոբայ (ցիպրոֆլօքսացին) 500մգ թաղանթապատ դեղահատեր:

MGF Group, agent of Bayer AG  
Postal address:  
0033 Yerevan, Armenia  
Baghramyan 59  
Tel.: +374 98 78 70 40  
[anna.babayan.ext@bayer.com](mailto:anna.babayan.ext@bayer.com)