

## Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ Քսարելտոն® դեղի մասին

- ◆ Քսարելտոն® արյան մակարդեղիությունը նվազեցնող դեղ է և այդպիսով կանխարգելելում է թրոմբոզների առաջացումը:
- ◆ Քսարելտոն® պետք է ընդունել ճիշտ այնպես, ինչպես նշանակել է Ձեր բժիշկը: Չի կարելի բաց թողնել դեղի ընդունումը՝ թրոմբոզից օպտիմալ պաշտպանություն ապահովելու նպատակով:
- ◆ Չպետք է դադարեցնել Քսարելտոն® առանց բժշկի հետ նախապես խորհրդակցելու, քանի որ արյան մակարդման վտանգը կարող է մեծանալ:
- ◆ Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին բոլոր այն դեղերի մասին, որոնք օգտագործում եք՝ նախքան Քսարելտոն® դեղի օգտագործումը:
- ◆ Պարտադիր տեղեկացրեք բուժող բժշկին Քսարելտոն® օգտագործելու մասին՝ նախքան ցանկացած վիրահատական գործողություններ կամ ինվազիվ միջամտություն սկսելը:

## Ե՞րբ է անհրաժեշտ դիմել բժշկի

Շատ կարևոր է իմանալ հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների մասին, եթե Դուք օգտագործում եք այնպիսի հակամակարդիչներ, ինչպիսին Քսարելտոն® է:

Արյունահոսությունը առավել հաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցությունն է: Ինքնուրույն մի սկսեք Քսարելտոն® դեղի ընդունումն՝ առանց բուժող բժշկի հետ խորհրդակցելու, եթե կա արյունահոսության վտանգ:


Անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի՝ արյունահոսության ցանկացած ախտանիշի առկայության դեպքում, օրինակ.

- ◆ Ցավ
- ◆ Այտուց կամ անհարմարավետության զգացողություն
- ◆ Գլխացավ, գլխապտույտ կամ թուլություն
- ◆ Կապտուկներ, քթային արյունահոսություն, արյունահոսություն լնդերից, արյունահոսություն կտրվածքներից, որոնք տևում են սովորականից ավել
- ◆ Սովորականից ավել առատ դաշտան, կամ արյունային արտադրություն հեշտոցից

- ◆ Կարդագույն կամ դարչնագույն մեզ, արյունոտ կամ սև կղանք
- ◆ Հազ կամ արյունային փսխում կամ «սուրճի մրուրի» նման փսխում

## Ինչպե՞ս ընդունել Քսարելտոն® դեղը

- ◆ Օպտիմալ պաշտպանության համար Քսարելտոն® դեղն օգտագործել՝
  - 2,5 մգ սննդի ընդունումից անկախ
  - 10 մգ սննդի ընդունումից անկախ
  - 15 մգ սնունդ ընդունելու ժամանակ
  - 20 մգ սնունդ ընդունելու ժամանակ



Քսարելտոն®  
դիվարօքսաբան



## Հուշաթերթ պացիենտի համար

Քսարելտոն® 2,5 մգ   
Քսարելտոն® 10 մգ   
Քսարելտոն® 15 մգ   
Քսարելտոն® 20 մգ

Լշեք սահմանված դեղաչափը

- ◆ Պահպանեք այս հուշաթերթը
- ◆ Այս հուշաթերթը պետք է տրամադրել յուրաքանչյուր բժշկի՝ նախքան բուժումը սկսելը

Ես ընդունում եմ Քսարելտո (ոփվարոքսաբան) դեղը հակամակարդիչ բուժման շրջանակում

ԱԱՀ	Այլ դեղեր/հիվանդություններ
Հասցե:	
Ծննդյան տարեթիվ	Քաշ

Այս պացիենտի հուշաթերթը նախատեսված է բացառապես այն պացիենտների համար, ովքեր ընդունում են Քսարելտո (ոփվարոքսաբան)՝ ըստ իրենց բժշկի ցուցումների: Պացիենտի հուշաթերթը պատրաստվել է Քսարելտո (ոփվարոքսաբան) դեղի դիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում, հաստատված է լիազորված մարմնի կողմից և չի հանդիսանում գովազդ: Դեղը նշանակումից և օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ներդիր-թերթիկը: Ներդիր-թերթիկների ներկայիս տարբերակը տեղադրված է կայքում <http://pharm.am>: Գրանցման հավաստագիր. Քսարելտո\* 2.5 մգ. ԳՀ №19035 գրանցված 09.01.2020թ. Քսարելտո\* 10 մգ. ԳՀ №21447 գրանցված 21.06.2023թ. Քսարելտո\* 15 մգ. ԳՀ №21448 գրանցված 21.06.2023թ. Քսարելտո\* 20 մգ. ԳՀ №21449 գրանցված 21.06.2023թ. Եթե ձեզ մոտ առաջացել են կողմնակի ազդեցություններ, խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր բժշկի կամ դեղատան աշխատակցի հետ: Կողմնակի ազդեցությունների մասին կարող եք հայտնել նաև. «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ԴՀ ԱՆ հասցե՝ Հայաստան, Երևան 0051, Կոմիտաս պող. 49/5: Թեժ գծի հեռախոսահամարներ՝ +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05: Էլ. փոստ՝ [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am) Հայաստան, Երևան 0080, Սայաթ-Նովա թաղամաս 8/3, Հեռախոս՝ +374 11 20 15 50 Նյութը պատրաստվել է «Բայեր», ԲԸ-ի աջակցությամբ

Արտակարգ իրավիճակի դեպքում ներկայացրեք հետևյալը.

Բժշկի ԱԱՀ
Բժշկի հեռախոսահամարը
Բժշկի կնիք

Խնդրում եմք հայտնել նաև հետևյալը.

ԱԱՀ
Հեռախոսահամար
Ընտանեկան հարաբերություններ

◆ **Տեղեկատվություն բժշկի համար.**  
 Միջազգային նորմալացված գործակցի (ՄԳ) արժեքները չպետք է օգտագործվեն, քանի որ դրանք Քսարելտո-ի® հակամակարդիչ ակտիվության հուսալի ցուցիչ չեն: